




Velkommen
til akutmodtagelsen
og akutklinikken





Hej med dig

Velkommen i akutmodtagelsen. Her hjælper vi børn og voksne, som er syge eller kommet til skade. Nogle gange kan her være meget travlt, for man ved aldrig hvor mange, der kommer til skade eller bliver syge og har brug for hjælp.

Derfor kan du komme til at vente på, at det bliver din tur.

Men vi ved, at du har brug for hjælp. Og vi gør alt for, at du får den helt rigtige behandling så hurtigt som muligt.

Her i akutmodtagelsen kan du møde en:




Sekretær, som tager imod dig, når du kommer. Sekretæren kan undersøge, hvornår det er din tur til at få hjælp.

Sygeplejerske, som undersøger dig først. Sygeplejersken kan hjælpe med medicin, en ispose, forbinding eller plaster, hvis du har ondt.

Radiograf, som er dygtig til at tage røntgenbilleder af knoglerne inde i kroppen.

Læge, som undersøger, hvad du fejler, og kan hjælpe dig med at få det godt igen.

I bogen her kan du læse om nogle børn, der er syge eller kommet til skade ligesom dig.





Skade



Anton har brækket armen

Her sidder Anton sammen med sin far. De er på akutmodtagelsen, fordi Anton er væltet på cyklen og har slået sin arm. Det gør meget ondt, og Anton er ked af det.

Sygeplejersken kommer hen til Anton og far. Hun spørger, om Anton har ondt. Anton nikker. Han vil ikke have, at hun rører ved hans arm.

- Du må gerne få noget smertestillende, siger hun og smiler.


Smertestillende er medicin, som får det til at gøre mindre ondt. Anton må selv vælge, om han vil have medicin som en pille eller som noget, han kan drikke.

Lægen kalder på Anton og siger, at han skal sætte sig sammen med far på en seng i det rum, hvor han skal undersøges. Lægen mærker forsigtigt på Antons arm. Og så bøjer hun den lidt til den ene side og en lille smule til den anden side.

- Av! siger Anton.

- Vi skal have taget et røntgenbillede for at se, om knoglen i din arm er brækket, siger lægen. Hun fortæller far, at de skal følge en stribe i gulvet hen til røntgenafdelingen.







Røntgenapparatet er et kæmpe kamera, der tager billeder inde i kroppen. Manden, der styrer røntgenkameraet, hedder en radiograf.

Radiograf, synes Anton, det lyder som.

Radiografen er god til at tage billeder med røntgenstråler, som han kalder supermandsstråler. Far skal have en tung kappe på, der ligner et stort forklæde, så strålerne ikke rammer ham. Men han må gerne sidde sammen med Anton, mens billederne bliver taget.

Anton skal lægge sin arm på en plade oven på et kryds af lys. Han skal sidde helt stille som en statue, så billederne ikke bliver rystede.

Radiografen går ind i rummet ved siden af og starter kameraet.

Røntgenstrålerne, der laver et billede af Antons arm, er usynlige. Man kan hverken se eller mærke dem, og de gør ikke ondt. Men maskinen brummer lidt. Når billedet er færdigt, kan lægen se Antons knogler inde i armen.

Anton og far må også gerne se billedet.

Lægen siger, at knoglen i Antons arm er brækket. Derfor skal Anton have gips på, så knoglen kan vokse sammen i fred og ro.

Først får Anton en hvid strømpe på armen og så noget vat. Så dypper sygeplejersken gipsstykkerne i varmt vand og lægger dem på Antons arm. Gipsen er dejlig varm, synes Anton. Til sidst får han en forbindelse rundt om gipsen, og så er han klar til at komme hjem igen - nu med en gipsarm.



FAKTA TIL FORÆLDRE

Gipsbehandling

Gips bruges for at beskytte og stabilisere et knoglebrud, så det kan vokse sammen og genvinde mest mulig funktion. Der findes mange forskellige slags gips. Som regel lægges gipsen på, mens den er fugtig og varm. Nogle gange er det nok med en gips-skinne og en forbindelse. Efter gipsen er lagt, har de fleste lidt smerter fra knoglebruddet. Men hvis barnet oplever stærke smerter, blå fingre/tæer eller følelsesløshed betyder det ofte, at gipsen er lagt for stramt, eller at der er for stor belastning på bruddet – kontakt da akutmodtagelsen!

Stik ikke en strikkepind eller andet ind under gipsen til at klø med, da det kan give sår på huden. Brug heller ikke talkum, pudder eller creme.

Røntgen

Røntgenstråler er usynlige, elektromagnetiske stråler. Tæt knoglevæv opsuger meget elektromagnetisk stråling og efterlader hvide skygger på det sorte røntgenbillede, mens bløde kropsdele som fedt, muskler, hud og blod er mere gennemsigtigt væv, der viser sig som mørkegrå skygger.

Risikoen for skadevirkninger efter røntgenbilleder er lille, da moderne røntgenapparater bruger meget lave stråledoser.




Skade



Sally har hul i hovedet


På en stol i venteværelset sidder Sally sammen med sin mor. Sally har et stort sår i panden. Hun faldt i børnehaven og slog hovedet ind i en radiator. Såret bløder, og Sally græder. Hun er bange for alt det blod. Mor har fået en våd klud af sygeplejersken, som hun holder på såret. Sally synes, det gør ondt. Men mor siger, at hun ikke må skubbe kluden væk. Den skal stoppe blodet.

Øv. Sallys fine gule kjole er helt plettet af blod fra det dumme sår i panden. Sygeplejersken kommer og snakker med Sally. Sygeplejersken smiler og siger, at sår i hovedet bløder meget, men at det ikke er så farligt, som det ser ud. Sally klarer det flot, synes sygeplejersken. Sally nikker stille. Hun har ondt i hovedet og vil helst bare hjem.



Lægen kalder på Sally. Nu er det hendes tur. Lægen vil tjekke, om hendes hjerne er blevet rystet, efter at hun ramte radiatoren med hovedet. Sally vidste ikke, at en hjerne sådan kunne ryste rundt inde i hovedet.

Lægen finder en lille lampe og lyser ind i Sallys øjne. Puha det er skarpt, det lys! Lægen kan ikke se hjernen gennem øjnene. Men han kan tjekke, om det sorte midt i øjnene, som hedder pupiller, bevæger sig, som de skal, når han lyser på dem. Det gør de heldigvis.



Sygeplejersken vasker forsigtigt Sallys sår. Sally siger av!

Men såret skal vaskes helt rent, så der ikke går betændelse i det. Så siger sygeplejersken, at Sallys sår skal syes. Sally spærrer øjnene op. Det tør hun ikke!

Men Sally skal ikke være bange, siger sygeplejersken. Hun har nemlig tryllecreme, som hun putter på såret. Og en maske med tryllestøv, der kan trylle det værste væk. Sally må selv vælge, om tryllestøvet i masken skal dufte af cola eller jordbær.

Tryllestøvet i masken hedder lattergas, og når hun trækker vejret gennem masken, bliver det hele lidt skørt og sjovt. Og så glemmer Sally helt at være bange for den supertynde nål med den gennemsigtige tråd.



Bagefter får Sally et flot Barbieplaster på såret. Hun synes faktisk, at hun ser ret sej ud. Det synes mor og lægen og sygeplejersken også. Hun får et flot lille ar, når såret er helet. Så kan de kalde hende Sally Sørøver.

FAKTA TIL FORÆLDRE

Sår i hovedet

Snitsår i hovedbunden kan give voldsom blødning, fordi huden her har mange blodkar. Det kan få en skade til at se alvorligere ud, end den er. Det vil ofte være nødvendigt at sy sår, der bløder voldsomt. Hvis såret har helt skarpe snitflader, kan det limes.

Hjernerystelse


Når dit barn har slået hovedet, er der risiko for hjernerystelse. Hjernerystelse kan give hovedpine, kvalme, opkastninger og svimmelhed. Ved kraftig hjernerystelse bliver man ofte indlagt til observation på hospitalet. I de fleste tilfælde aftager symptomerne efter få timer. I skal reagere og kontakte lægen, hvis hovedpinen tager til, eller hvis dit barn har opkastninger, nedsat bevidsthed eller er forvirret.

Lattergas

Lattergas hjælper børn med at være så smertefri som muligt. Det gør oplevelsen mindre traumatisk. Lattergas er velegnet til at berolige og bedøve, hvis barnet er bange, eller ved indgreb som kan gøre ondt. Fx ved behandling af brækkede knogler, splinter eller sår, der skal vaskes og syes. Lattergas er effektivt, fordi det virker med det samme og hurtigt udskilles fra kroppen igen. Lattergas gør ikke ondt som et bedøvende stik, og barnet er ved bevidsthed og kan følge med i behandlingen.



Sygdom



Amina hoster

Amina hoster, og når hun trækker vejret, så hvæser det nede fra brystet. Hun er varm og sover lidt på fars skød. De sidder i akutmodtagelsen på hospitalet og venter på, at det bliver deres tur til at komme ind til lægen.

Aminas navn bliver råbt op. Far bærer hende ind i undersøgelsesrummet. Lægen snakker lidt med far og spørger, om Amina har feber. Far nikker og ær Aminas røde, varme kinder. Lægen finder et termometer frem og stikker det forsigtigt ind i Aminas øre for at måle hendes temperatur. Uha, hun har høj feber, synes lægen.

Lægen siger, at far skal løfte op i Aminas bluse. Så lytter hun med en dims, der hedder et stetoskop, på Aminas mave og ryg. Den er lidt kold. Lægen skal høre, hvordan hendes hjerte banker, og hvordan

hendes lunger lyder. Imens skal hun trække vejret laaaaangt ned i maven. Amina har svært ved at trække vejret, og der kommer en hvæsende lyd fra hendes hals.

Host! Host!

- Du har det da vist ikke så godt, siger lægen.

Amina ryster på hovedet.




Lægen kan godt høre, det ikke lyder helt, som det skal.

Så finder lægen en lygte frem, som passer ind i hullet i Aminas øre, så hun kan se ind, om der er sygdom derinde.

Lægen kigger også ned i Aminas hals.

- Sig aaaaaaah, siger lægen, mens hun trykker på Aminas tunge med noget, der ligner en stor ispind.
Adr! Det kan Amina ikke lide. Men heldigvis er det hurtigt overstået.



Lægen fortæller, at Amina skal have noget medicin i en maske. Så vil hun få det godt igen. Masken skal sidde uden på Aminas mund og næse. Amina synes ikke, det er rart.

Men far og lægen siger, at hun ikke må tage den af. Lægen siger, at der er tryllestøv i masken.

Åh, bare hun måtte tage masken af! Den hvæser som en sur kat.

Men når hun trækker luften dybt ned i maven, så kan hun godt mærke, at tryllestøvet virker, og at det er nemmere at trække vejret.

Far og lægen synes, at Amina er meget sej og modig. Det synes hun faktisk også selv.



FAKTA TIL FORÆLDRE

Når dit barn har feber

Feber er kroppens forsvar mod virus og bakterier. Feber er ikke farlig i sig selv, med mindre feberen når over 41 grader. Et barn med feber skal have masser af væske – vand, saftvand eller sodavand. Sukkerholdige drikke er særligt gode, hvis barnet også kaster op eller har diarré. For at barnet skal komme af med febervarmen, skal det have så lidt tøj på som muligt, og rummet skal være køligt. Efter aftale med lægen kan dit barn også få smertestillende medicin, der samtidig kan få feberen til at falde.

Behandling med inhalationsmaske

Medicin i en inhalationsmaske hjælper barnet til nemmere at trække vejret ved at udvide luftvejene. Ved hjælp af ilt eller atmosfærisk luft bliver medicinen forstøvet gennem masken, så det bliver nemmere at optage nede i lungerne.

Børn kan reagere og blive bange for inhalationsmasken. Derfor er det en god ide at sidde med barnet og først lege lidt med masken og eventuelt prøve den på mor, far eller en bamse. Inhalationen varer 5-10 minutter, til der ikke kommer mere "damp" ud af masken, og kammeret med medicin er tomt.



Tapperhedsdiplom

Gives hermed til:

.....

for sej og flot indsats og tapperhed,

da du blev behandlet for:

.....

Dato