

Dato: 01.11.2014

Bilag 3

Postoperativ vurdering og behandling

Terapeutisk mål er BS 7-11 mmol/L

0-6 timer postoperativt

Indtil patienten kan spise et fuldt måltid fortsættes GI-infusion.
BS måles x 1 i timen så længe GI-infusion er tilsluttet.
Ved BS under 5 eller over 11 se **skema 4**.

Postoperativt på stamafdelingen eller såfremt opvågningsforløb overstiger 6 timer

Undersøgelser

BS x 6/døgn (inden måltider + 3 derudover)
K, Na og kreatinin x 1 i døgnet - urinstix ved BS over 11

Behandling:

Pt. som ikke kan indtage pr. os

Såfremt patienten ikke efter 6 timer er i stand til at indtage et fuldt måltid, skiftes til GIK-infusion, såfremt K under 3,5 og kreatinin normal (bilag 1, skema 3).
Ved BS under 5 eller over 11 se **skema 4**.
BS x 1 i timen så længe patienten har GI (K) infusion.

Behandling:

Pt. som indtager pr. os

Ved det første måltid genoptages vanlig insulin og/eller peroral antidiabetisk behandling, og GI (K) infusion stoppes.
Ved insulinpumpe tilkobles denne.

Skema 4

Postoperativ intervention ved BS < 5 eller > 11

BS	Behandling	Efterfølgende intervention
BS under 5	100 ml glukose 10 % i.v. eller p.o. Ved GI-infusion sættes som sidedrop	BS 1 time efter intervention
BS 11,0 - 11,9	Giv 4 IE s.c. (evt. i.m. eller i.v.)	BS 2-4 timer efter intervention - vent 4 timer med evt. at give insulin igen
BS 12,0 - 15,9	Giv 6 IE s.c. (evt. i.m. eller i.v.)	BS 2-4 timer efter intervention - vent 4 timer med evt. at give insulin igen
BS over 16	Giv 8 IE s.c. (evt. i.m. eller i.v.)	BS 2-4 timer efter intervention - vent 2 timer med evt. at give insulin igen