

# Gribskov Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.900 personer i kommunen)	5	6	6	5	6	6	5
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (4.600 personer i kommunen)	18	14	15	14	14	12	17
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.800 personer i kommunen)	16	20	20	20	16	19	23
Ensomhed # (3.900 personer i kommunen)	13	12	11	13	25	11	7
Høj score på stressskala # (9.200 personer i kommunen)	30	28	25	31	44	28	20
Daglig rygning # (4.800 personer i kommunen)	13	15	18	12	17	15	12
E-cigaretter # (1.200 personer i kommunen)	3	4	3	4	7	4	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (700 personer i kommunen)	3	2	3	1	8	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.800 personer i kommunen)	7	9	10	7	7	8	10
Rusdrikker ugentligt # (3.300 personer i kommunen)	12	10	13	8	9	12	7
Usundt kostmønster # (5.500 personer i kommunen)	14	17	23	11	22	16	16
Lav fysisk aktivitet # (6.200 personer i kommunen)	18	19	21	17	22	17	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (14.900 personer i kommunen)	62	49	48	50	69	55	29
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (9.100 personer i kommunen)	35	31	32	30	44	24	35
Inaktiv transport ** ## (8.300 personer i kommunen)	27	48	49	47	32	54	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.600 personer i kommunen)	32	39	47	32	31	41	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.100 personer i kommunen)	15	19	21	17	17	23	14
Meget generet af søvnproblemer # (5.300 personer i kommunen)	14	16	13	19	23	16	11

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gribskov Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.400 personer i kommunen)	5,3	7,0	8,7	5,4	0,8	5,4	13,2
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	3,6	5,3	6,7	3,8	0,2	2,6	12,2
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,7	3,1	2,3	=	1,5	6,1
Kræft *** (1.800 personer i kommunen)	3,7	5,3	4,7	5,8	0,2	3,2	11,2
KOL * (2.400 personer i kommunen)	4,7	6,9	6,5	7,3	=	5,4	13,2
Astma ** (2.400 personer i kommunen)	6,1	7,1	6,0	8,1	5,7	6,8	8,2
Allergi – selvrapporeret ## (9.300 personer i kommunen)	31,3	28,7	26,0	31,3	30,8	30,2	25,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,7	2,1	2,1	2,2	0,7	1,9	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (9.600 personer i kommunen)	19,2	29,2	24,8	33,6	5,5	27,1	45,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.400 personer i kommunen)	12,7	19,6	19,1	20,2	12,5	20,7	22,0
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,3	1,0	5,5	=	1,3	8,1
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.100 personer i kommunen)	16,8	18,7	13,3	24,1	31,0	22,8	5,5
Depression ** (2.400 personer i kommunen)	6,4	7,1	5,2	8,9	4,9	7,1	8,1
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	3,6	3,2	2,4	4,1	5,4	3,3	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	2,8	2,5	3,1			2,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gribskov Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.500 personer i kommunen)	5	5	5	5	4	4	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.600 personer i kommunen)	15	16	14	18	8	16	22
Ensomhed ## (2.500 personer i kommunen)	8	8	7	8	14	7	5
Høj score på stresskala # (7.700 personer i kommunen)	25	24	20	27	30	22	22
Daglig rygning # (5.800 personer i kommunen)	16	17	19	16	16	20	13
E-cigaretter ## (1.000 personer i kommunen)	3	3	4	2	4	3	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.400 personer i kommunen)	8	11	13	8	8	10	13
Rusdrikker ugentligt # (3.400 personer i kommunen)	14	10	16	5	9	12	8
Usundt kostmønster # (5.200 personer i kommunen)	12	16	21	11	18	15	16
Lav fysisk aktivitet ## (6.600 personer i kommunen)	19	20	20	20	22	17	23
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (16.600 personer i kommunen)	64	53	54	52	69	57	37
Skærmtid – 4 timer eller mere # (8.900 personer i kommunen)	31	29	32	27	34	22	39
Inaktiv transport ** ## (7.500 personer i kommunen)	20	40	41	38	24	46	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.200 personer i kommunen)	31	37	45	28	25	39	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.000 personer i kommunen)	13	18	18	18	11	21	16
Meget generet af søvnproblemer # (4.600 personer i kommunen)	13	14	11	16	14	15	11

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gribskov Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	5,1	6,4	8,0	4,9	0,6	4,5	13,3
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	4,1	5,8	7,2	4,5	0,2	3,2	13,7
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,6	1,9	=	1,3	5,3
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	3,4	4,7	4,3	5,1	0,3	2,9	10,4
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,6	6,8	6,2	7,4	=	5,4	13,4
Astma ** (2.300 personer i kommunen)	6,0	6,8	5,6	8,0	5,3	6,3	8,6
Allergi – selvrapporeret ## (8.700 personer i kommunen)	29,2	26,5	22,2	30,7	27,5	29,4	21,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,6	1,7	1,5	1,9	0,6	1,6	2,7
Slidgigt – selvrapporeret # (8.300 personer i kommunen)	18,0	25,2	21,3	29,0	1,6	21,7	44,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.900 personer i kommunen)	11,6	15,2	15,0	15,5	5,7	17,4	17,2
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,7	2,8	0,9	4,7	=	1,1	7,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.000 personer i kommunen)	16,0	15,5	10,0	21,0	16,4	20,6	6,7
Depression ** (2.700 personer i kommunen)	7,1	7,8	5,8	9,8	5,0	8,0	9,4
Angst ** (900 personer i kommunen)	3,0	2,6	1,9	3,3	4,2	2,7	1,6
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	2,9	2,5	3,2			2,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gribskov Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.700 personer i kommunen)	13	14	14	15	3	13	22
Høj score på stressskala # (5.600 personer i kommunen)	21	18	16	20	23	17	18
Daglig rygning # (5.700 personer i kommunen)	15	17	21	15	18	21	11
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.000 personer i kommunen)	10	9	12	7	7	8	13
Rusdrikker ugentligt # (2.900 personer i kommunen)	15	9	16	3	11	10	6
Usundt kostmønster # (3.500 personer i kommunen)	10	11	14	8	11	12	10
Lav fysisk aktivitet # (4.600 personer i kommunen)	15	15	15	15	15	13	17
Inaktiv transport ** ## (8.700 personer i kommunen)	22	46	51	41	33	51	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.000 personer i kommunen)	30	37	43	31	22	39	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.300 personer i kommunen)	11	13	13	13	6	16	11
Meget generet af søvnproblemer # (3.400 personer i kommunen)	11	11	10	11	12	11	9

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gribskov Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	4,9	6,0	7,2	4,7	0,6	4,4	12,7
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	4,3	5,5	6,7	4,3	0,2	3,0	13,9
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,3	1,9	=	1,3	5,1
Kræft *** (1.300 personer i kommunen)	3,2	4,0	3,8	4,2	0,3	2,6	9,3
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,3	6,8	6,1	7,5	=	6,2	12,6
Astma ** (2.300 personer i kommunen)	6,0	7,0	5,7	8,2	5,4	6,6	8,8
Allergi – selvrapporeret ## (7.700 personer i kommunen)	27,5	24,4	21,4	27,4	17,3	27,0	24,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,4	1,4	1,2	1,6	0,5	1,2	2,4
Slidgigt – selvrapporeret # (8.300 personer i kommunen)	17,6	26,4	20,4	32,0	2,7	22,5	45,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.900 personer i kommunen)	12,2	18,7	17,8	19,5	10,3	20,9	18,7
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,6	2,3	0,8	3,8	=	0,9	6,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	13,5	14,4	9,9	18,7	14,8	18,1	7,6
Depression ** (2.800 personer i kommunen)	8,1	8,5	6,2	10,7	5,4	8,8	10,0
Angst ** (700 personer i kommunen)	2,7	2,1	1,4	2,9	3,0	2,2	1,4
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	2,2	1,8	2,5			2,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gribskov Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.300 personer i kommunen)	14	17	15	18	8	17	24
Høj score på stresskala ## (6.200 personer i kommunen)	22	20	17	24	24	19	21
Daglig rygning # (6.700 personer i kommunen)	19	21	22	21	19	24	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.300 personer i kommunen)	13	14	15	12	12	13	17
Usundt kostmønster # (3.300 personer i kommunen)	10	10	14	7	13	9	11
Lav fysisk aktivitet # (4.300 personer i kommunen)	14	13	14	13	13	11	19
Inaktiv transport ** ## (9.100 personer i kommunen)	24	47	50	44	30	54	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.900 personer i kommunen)	30	37	46	30	25	40	42
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.200 personer i kommunen)	11	13	14	12	11	13	15
Meget generet af søvnproblemer # (3.500 personer i kommunen)	11	11	9	13	10	12	9

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gribskov Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gribskov Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	4,2	4,8	5,9	3,7	0,6	3,7	10,6
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	4,3	5,1	6,0	4,1	0,2	2,9	14,2
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,4	1,7	=	1,3	5,3
Kræft *** (1.100 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,2	3,4	0,3	2,4	8,0
KOL * (2.000 personer i kommunen)	3,9	6,0	5,2	6,8	=	5,8	11,5
Astma ** (2.300 personer i kommunen)	6,0	7,0	5,9	8,2	5,4	6,7	9,2
Allergi – selvrapporeret ## (7.700 personer i kommunen)	26,7	25,2	22,5	27,9	24,6	27,9	18,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,3	1,2	1,0	1,3	0,4	1,0	2,3
Slidgigt – selvrapporeret # (7.600 personer i kommunen)	17,7	24,1	20,8	27,2	2,8	24,1	43,8
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.800 personer i kommunen)	12,5	15,4	15,9	15,1	6,6	16,7	20,3
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,2	1,6	0,4	2,7	=	0,8	4,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.100 personer i kommunen)	15,6	16,6	10,7	22,0	18,6	19,5	7,0
Depression ** (2.600 personer i kommunen)	7,7	7,9	5,7	10,0	4,6	8,0	10,2
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,4	1,9	1,2	2,5	2,2	2,0	1,4
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	2,3	1,8	2,7			2,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.