Stikskade 0 prøve			
Udgiver	Nordsjællands Hospital > Klinisk Biokemisk Afdeling		
Dokumenttype	Skemaer og tjeklister	Version	4
Forfattere	CEK	Gældende fra	23-08-2022
Fagligt ansvarlig	Claus Antonio Juel Jensen	Næste revision	22-08-2024
Ændringer	Opdateret links		

Region Hovedstaden	**WebReq Laboratorieprofil - Stikskade 0 prøve**
Laboratorieprofilens navn	**Stikskade 0 prøve**
Profilen udløser følgende analyser	Hep Bs Ab;P Hep Bs Ag;P Hep.C vir.Ab;P HIV 1+2 (Ab + ag);P Stikskade 0 prøve info
Indikation og anden information om profilen	Profilen anvendes når sundhedspersonale er blevet udsat for stikuheld eller anden eksposition for blod. Prøverne tages umiddelbart efter eksposition. Profilen følger Region Hovedstadens vejledning Profylakse ved stikuheld og sprøjt på sår eller slimhinder. Vejledningens formål er at forhindre blodbåren smitte med hepatitis B, C og HIV i forbindelse med stikuheld eller ved forekomst af sprøjt på sår og slimhinder. Profilen udgør den første af i alt 3 opfølgende undersøgelser efter eksposition. De to andre undersøgelser der anbefales 1 måned og 3 måneder efter eksposition kan i WebReq bestilles via profilerne: "Stikskade 1 måned" og "Stikskade 3 måneder". "Stikskade 0 prøve info" er en "info-analyse" der informerer om laboratorieprofilen af samme navn. Det er profilen, der skal bestilles, så følger "info-analysen" automatisk med. Links RegionH: Profylakse ved stikuheld og sprøjt på sår eller slimhinder Sundhedstyrelsen: VEJLEDNINGOM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS